





Ausgewählte Pflanzen der Schwarzen Liste (sollten eingedämmt werden)

Wissenschaftliche Namen	Deutsche Namen	Bild	Beschreibung (s. auch http://www.jardinsuisse.ch und http://www.cps-skew.ch/deutsch/infoblaetter_invasive.htm)	Problematik
Buddleja davidii	Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch		Sommergrüner, 2-3 m hoher Strauch, mit lang zugespitzten und gezähnten, lanzettlichen Blättern, unterseits dicht graufilzig behaart. Blüten in dichten, zylindrischen Rispen von 20-50 cm Länge. Blüten dunkel violett bis lila, röhrig, ca. 1 cm lang, mit vierzipfligem Saum. Frucht eine längliche, kleine Kapsel. Blütezeit Juli bis August.	Kann dichte Bestände bilden, welche die einheimische Vegetation verdrängen.
Prunus laurocerasus L.	Kirschlorbeer		Ein immergrüner Strauch oder Baum bis 6 m Höhe, vollständig kahl und lederigen Blättern. Diese sind breitlanzettlich, 10-15 cm lang, ganzrandig, oberseits glänzend und dunkelgrün, unterseits heller. Der Rand ist oft nach unten gebogen. Die weissen Blüten entstehen in 10-15 cm langen, aufrechten Trauben. Die kugeligen Früchte sind glänzend schwarz und haben einen Durchmesser von 7-10 mm.	Natur: Verhindert Verjüngung einheimischer Gehölze. Die starke Beschattung verdrängt auch den Unterwuchs. Mensch: Ganze Pflanze, aber vor allem die Blätter und Samen, enthalten blausäurehaltige Glycoside und sind giftig. Nur das Fruchtfleisch nicht.

<p>Robinia pseudoacacia L.</p>	<p>Falsche Akazie, Robinie</p>		<p>Sommergrüner Baum, bis 30 m hoch, Rinde graubraun mit tiefen Längsrissen. Triebe mit paarig angelegten Dornen, Blätter zusammengesetzt – unpaarig gefiedert, Teilblätter ganzrandig, 2-5 cm lang. Nebenblätter zu starken Dornen umgebildet. Blüten weiss, wohlriechend, in lockeren und hängenden Trauben von 10-20 cm Länge. Früchte trockene Hülsen, 4-10 cm lang, mit rundlichen Samen. Blütezeit Mai bis Juni.</p>	<p>Mensch/Tier: Rinde, Samen und Blätter sind giftig (Lectine). Für Tiere kann es tödlich sein.</p> <p>Natur: Die Robinie ist ein raschwüchsiger Baum, der durch Ausleger und Stockausschläge grössere Flächen einnehmen kann. Verdrängt einheimische Sträucher und Bäume.</p>
<p>Rubus armeniacus</p>	<p>Armenische Brombeere</p>		<p>Strauch mit kräftigen Schösslingen mit 8-25 mm Durchmesser, glänzend grünlich, im Sommer mit auffallend roten Kanten und roten Stachelfüssen. Blätter gross, unterseits weissgrau filzig behaart, 5-zählig. Teilblätter breit oval und gegen das Ende zugespitzt. Blütenstand gross, Blüten blassrosa, 14-20 mm lang. Blütezeit Juni-August. Schwarze Früchte.</p>	<p>Bildet mächtige Dickichte und unterdrückt durch Beschattung und Konkurrenz das Aufkommen einheimischer Arten.</p>